



feeding matters

CUANDO REFERIR SIGNOS Y SÍNTOMAS INFANTILES DE TAP

Trastorno de alimentación pediátrico (TAP) son problemas de ingestión oral que no es apropiada para la edad y está asociada con una disfunción médica, nutricional, de habilidades de alimentación y/o psicosocial.

Goday PS, Huh SY, Silverman A, et al. Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2019;68(1):124-129. doi:10.1097/MPG.0000000000002188.

Cuestionario de Alimentación Infantil©

Detección de 6 preguntas

¿Su bebé/niño le avisa cuando tiene hambre?	Sí	No	
¿Usted cree que su bebé/niño come lo suficiente?	Sí	No	
¿Cuántos minutos se tarda normalmente en alimentar a su bebé/niño?	<5	5-30	>30
¿Tiene que hacer algo especial para ayudar a su bebé/niño a comer?	Sí	No	
¿Su bebé/niño le avisa cuando está lleno?	Sí	No	
Basado en las preguntas anteriores, ¿tiene inquietudes sobre la alimentación de su bebé/niño?	Sí	No	

Silverman AH, Kristoffer BS, Linn C, et al. Psychometric Properties of the Infant and Child Feeding Questionnaire. *Journal of Pediatrics.* 2020 August;223:81-86.e2. DOI: 10.1016/j.jpeds.2020.04.040

Código ICD de TAP

Publicado en ICD-10-CM 2022

R63.31 Trastorno alimentario pediátrico, agudo

R63.32 Trastorno alimentario pediátrico, crónico



SIGNOS Y SÍNTOMAS INFANTILES DE TAP

Médico

- o dificultad para respirar con y sin alimentación
- o cambios de color en los labios o la cara al comer o beber
- o sudoración al comer o beber
- o gorgoteos o chirridos con y sin alimentación
- o infecciones de las vías respiratorias altas recurrentes
- o llorar, arquearse, toser, hacer muecas al comer o beber
- o sospecha de alergias alimentarias
- o múltiples cambios de fórmula
- o vómitos
- o nunca parece tener hambre
- o malestar físico al comer o beber

Nutrición

- o incapaz de comer o beber lo suficiente para crecer o mantenerse hidratado
- o cambio insuficiente o demasiado rápido en el peso o la altura
- o falta de un determinado nutriente, por ejemplo, hierro, calcio
- o necesidad de suplementos nutricionales
- o dependencia de un alimento en particular para la nutrición
- o necesidad de alimentos enterales para nutrición- sonda nasogástrica, sonda gástrica, nutrición parenteral
- o estreñimiento
- o diversidad dietética limitada para la edad
 - muy pocas frutas y/o verduras
 - fuente de proteína limitada o ausente
 - muy pocos alimentos consumidos de forma regular

Habilidad de Alimentación (12 meses o menos de edad)

- o respiración laboriosa, ruidosa o quedar sin aliento
- o tos, asfixia, náuseas o arcadas
- o gorgoteos o respiraciones húmedas
- o tragos fuerte y/o duros
- o incapaz de comer o beber lo suficiente para un crecimiento óptimo
- o tiempos de comida excesivamente cortos (<5 minutos)
- o tiempos de comida excesivamente largas (>30 minutos)
- o necesidad de líquidos espesados
- o necesidad de alimento especial o alimento con textura modificada
- o necesidad de estrategias especiales, posicionamiento o equipo
- o incapaz de prenderse al pecho o al biberón sin ayuda
- o succión débil
- o necesidad de marcar el ritmo, control del flujo o descansos
- o necesidad de equipo especial para amamantar o alimentar con biberón
- o a menudo esta demasiado cansado para comer o se duerme rápidamente al comer
- o se alimentan de el pecho o el biberón mejor cuando duermen, es decir, se alimentan en sueños
- o incapaz de hacer la transición a sólidos
- o incapaz de dejar el pecho o el biberón

Psicosocial

- o incapaz de venir o quedarse con la familia en las comidas
- o denegación a comer lo que se ofrece o a comer en absoluto
- o comportamientos disruptivos a la hora de comer
- o incapaz de comer con otros presentes a la hora de comer
- o estrés infantil, preocupación o miedo durante las comidas
- o estrés, preocupación o miedo del guardián al alimentar al niño
- o presencia de sobornos, amenazas, gritos a la hora de comer
- o necesidad de distracción y/o recompensas por comer
- o interacciones desagradables a la hora de comer entre el guardián y el niño

¿Hay signos de TAP presentes?

Si la respuesta es sí, consultar temprano y con frecuencia para la identificación temprana de TAP.

Consultas Recomendadas:

- Médico Nutrición Habilidad de Alimentación Psicosocial