

CUANDO REFERIR SIGNOS Y SÍNTOMAS INFANTILES DE TAP

Trastorno de alimentación pediátrico (TAP) son problemas de ingestión oral que no es apropiada para la edad y está asociada con una disfunción médica, nutricional, de habilidades de alimentación y/o psicosocial.

Goday PS, Huh SY, Silverman A, et al. *Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework. J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2019;68(1):124-129. doi:10.1097/MPG.0000000000002188.

Código ICD de TAP

Publicado en ICD-10-CM 2022

R63.31

Trastorno alimentario pediátrico, agudo

R63.32

Trastorno alimentario pediátrico, crónico

Cuestionario de Alimentación Infantil©

DETECCIÓN DE 6 PREGUNTAS

¿Su bebé/niño le avisa cuando tiene hambre?	SÍ	NO	
¿Usted cree que su bebé/niño come lo suficiente?	SÍ	NO	
¿Cuántos minutos se tarda normalmente en alimentar a su bebé/niño?	<5	5-30	>30
¿Tiene que hacer algo especial para ayudar a su bebé/niño a comer?	SÍ	NO	
¿Su bebé/niño le avisa cuando está lleno?	SÍ	NO	
Basado en las preguntas anteriores, ¿tiene inquietudes sobre la alimentación de su bebé/niño?	SÍ	NO	

Silverman AH, Kristoffer BS, Linn C, et al. *Psychometric Properties of the Infant and Child Feeding Questionnaire. Journal of Pediatrics.* 2020 August;223:81-86.e2. DOI: 10.1016/j.jpeds.2020.04.040

Signos y Síntomas Infantiles de TAP

Habilidad de Alimentación (12 meses o menos de edad)

- o respiración laboriosa, ruidosa o quedar sin aliento
- o tos, asfixia, náuseas o arcadas
- o gorgoteos o respiraciones húmedas
- o tragos fuerte y/o duros
- o incapaz de comer o beber lo suficiente para un crecimiento óptimo
- o tiempos de comida excesivamente cortos (<5 minutos)
- o tiempos de comida excesivamente largas (>30 minutos)
- o necesidad de líquidos espesados
- o necesidad de alimento especial o alimento con textura modificada
- o necesidad de estrategias especiales, posicionamiento o equipo
- o incapaz de prenderse al pecho o al biberón sin ayuda
- o succión débil
- o necesidad de marcar el ritmo, control del flujo o descansos
- o necesidad de equipo especial para amamantar o alimentar con biberón
- o a menudo esta demasiado cansado para comer o se duerme rápidamente al comer
- o se alimentan de el pecho o el biberón mejor cuando duermen, es decir, se alimentan en sueños
- o incapaz de hacer la transición a sólidos
- o incapaz de dejar el pecho o el biberón

Psicosocial

- o incapaz de venir o quedarse con la familia en las comidas
- o denegación a comer lo que se ofrece o a comer en absoluto
- o comportamientos disruptivos a la hora de comer
- o incapaz de comer con otros presentes a la hora de comer
- o estrés infantil, preocupación o miedo durante las comidas
- o estrés, preocupación o miedo del guardián al alimentar al niño
- o presencia de sobornos, amenazas, gritos a la hora de comer
- o necesidad de distracción y/o recompensas por comer
- o interacciones desagradables a la hora de comer entre el guardián y el niño

Nutrición

- o incapaz de comer o beber lo suficiente para crecer o mantenerse hidratado
- o cambio insuficiente o demasiado rápido en el peso o la altura
- o falta de un determinado nutriente, por ejemplo, hierro, calcio
- o necesidad de suplementos nutricionales
- o dependencia de un alimento en particular para la nutrición
- o necesidad de alimentos enterales para nutrición-sonda nasogástrica, sonda gástrica, nutrición parenteral
- o estreñimiento
- o diversidad dietética limitada para la edad
 - muy pocas frutas y/o verduras
 - fuente de proteína limitada o ausente
 - muy pocos alimentos consumidos de forma regular

Médico

- o dificultad para respirar con y sin alimentación
- o cambios de color en los labios o la cara al comer o beber
- o sudoración al comer o beber
- o gorgoteos o chirridos con y sin alimentación
- o infecciones de las vías respiratorias altas recurrentes
- o llorar, arquearse, toser, hacer muecas al comer o beber
- o sospecha de alergias alimentarias
- o múltiples cambios de fórmula
- o vómitos
- o nunca parece tener hambre
- o malestar físico al comer o beber

¿Hay signos de TAP presentes? Si la respuesta es sí, consultar temprano y con frecuencia para la identificación temprana de TAP.

Consultas Recomendadas:

- Médico
- Nutrición
- Habilidad de Alimentación
- Psicosocial

CUANDO REFERIR SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL NIÑO DE TAP

Trastorno de alimentación pediátrico (TAP) son problemas de ingestión oral que no es apropiada para la edad y está asociada con una disfunción médica, nutricional, de habilidades de alimentación y/o psicossocial.

Goday PS, Huh SY, Silverman A, et al. *Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework. J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2019;68(1):124-129. doi:10.1097/MPG.0000000000002188.

Código ICD de TAP

Publicado en ICD-10-CM 2022

R63.31

Trastorno alimentario pediátrico, agudo

R63.32

Trastorno alimentario pediátrico, crónico

Cuestionario de Alimentación Infantil©

DETECCIÓN DE 6 PREGUNTAS

¿Su bebé/niño le avisa cuando tiene hambre?	SÍ	NO	
¿Usted cree que su bebé/niño come lo suficiente?	SÍ	NO	
¿Cuántos minutos se tarda normalmente en alimentar a su bebé/niño?	<5	5-30	>30
¿Tiene que hacer algo especial para ayudar a su bebé/niño a comer?	SÍ	NO	
¿Su bebé/niño le avisa cuando está lleno?	SÍ	NO	
Basado en las preguntas anteriores, ¿tiene inquietudes sobre la alimentación de su bebé/niño?	SÍ	NO	

Silverman AH, Kristoffer BS, Linn C, et al. *Psychometric Properties of the Infant and Child Feeding Questionnaire. Journal of Pediatrics.* 2020 August;223:81-86.e2. DOI: 10.1016/j.jpeds.2020.04.040

Signos y Síntomas del Niño de TAP

Habilidad de Alimentación (12 meses o menos de edad)

- o respiración laboriosa, ruidosa o quedar sin aliento
- o tos, asfixia, náuseas o arcadas
- o gorgoteos o respiraciones húmedas
- o tragos fuerte y/o duros
- o incapaz de comer o beber lo suficiente para un crecimiento óptimo
- o tiempos de comida excesivamente cortos (<5 minutos)
- o tiempos de comida excesivamente largas (>30 minutos)
- o necesidad de líquidos espesados
- o necesidad de alimento especial o alimento con textura modificada
- o necesidad de estrategias especiales, posicionamiento o equipo
- o pastoreo entre comidas programadas
- o denegación a comer, beber o tragar ciertas texturas de alimentos
- o necesita distracción para comer, como ver algo en una pantalla
- o necesita elogios/amenazas/sobornos excesivos para comer
- o dificultad para masticar alimentos apropiados para la edad
- o incapaz de comer en situaciones nuevas o desconocidas

Psicosocial

- o incapaz de venir o quedarse con la familia en las comidas
- o denegación a comer lo que se ofrece o a comer en absoluto
- o comportamientos disruptivos a la hora de comer
- o incapaz de comer con otros presentes a la hora de comer
- o estrés infantil, preocupación o miedo durante las comidas
- o estrés, preocupación o miedo del guardián al alimentar al niño
- o presencia de sobornos, amenazas, gritos a la hora de comer
- o necesidad de distracción y/o recompensas por comer
- o interacciones desagradables a la hora de comer entre el guardián y el niño

Nutrición

- o incapaz de comer o beber lo suficiente para crecer o mantenerse hidratado
- o cambio insuficiente o demasiado rápido en el peso o la altura
- o falta de un determinado nutriente, por ejemplo, hierro, calcio
- o necesidad de suplementos nutricionales
- o dependencia de un alimento en particular para la nutrición
- o necesidad de alimentos enterales para nutrición-sonda nasogástrica, sonda gástrica, nutrición parenteral
- o estreñimiento
- o diversidad dietética limitada para la edad
 - muy pocas frutas y/o verduras
 - fuente de proteína limitada o ausente
 - muy pocos alimentos consumidos de forma regular

Médico

- o dificultad para respirar con y sin alimentación
- o cambios de color en los labios o la cara al comer o beber
- o sudoración al comer o beber
- o gorgoteos o chirridos con y sin alimentación
- o infecciones de las vías respiratorias altas recurrentes
- o llorar, arquearse, toser, hacer muecas al comer o beber
- o sospecha de alergias alimentarias
- o múltiples cambios de fórmula
- o vómitos
- o nunca parece tener hambre
- o malestar físico al comer o beber

¿Hay signos de TAP presentes? Si la respuesta es sí, consultar temprano y con frecuencia para la identificación temprana de TAP.

Consultas Recomendadas:

- Médico
- Nutrición
- Habilidad de Alimentación
- Psicossocial